

voorkomende soort in Nederland zijn. De larven daarvan zitten ook aan de wortels van allerlei planten. Vraat van snuitkevers is te herkennen aan gekartelde randen, dus van buiten naar binnen aangevreten bladeren.

Engerlingen zijn goed te bestrijden met de Insectparasitaire nematoden (aaltjes) die de larven binnendringen en een bacterie afscheiden die de larven doden. In de dode larven ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaan naar nieuwe larven om zich voort te planten. Ze zijn onschadelijk voor planten, mens en dier en vallen onder de Nieuwe Flora en Faunawet als nuttige bodembewoner.

Deze nematoden zijn momenteel te koop in de tuinwinkel op donderdagmorgen en zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Voor uitgebreide informatie kunt u www.biocontrole.nl bezoeken.



Plaats van aardappelen dit jaar

De plaats waar dit jaar de aardappelen gepoot moeten worden is het midden van de tuin.

Zoals u weet is het wettelijk verplicht om de aardappelen elk jaar op een andere plaats te poten.

Er is op ons complex de regeling om dat met z'n allen op het zelfde gedeelte van de tuin te de tuin te doen. Voor een klein aantal tuinen is de indeling anders.

Het bestuur zal een controle uitvoeren of ieder deze regeling naleeft.

Mocht blijken dat de aardappels niet op een goede plaats staan dan moeten deze verplant worden.

Er komt een tekening met de plaats waar aardappelen gepoot dienen te worden in het mededelingen bord aan het tuinhuis.

Nieuwsbrief


Nummer 12, april 2008



Volkstuinvereniging 'Levenslust'

*Van de voorzitter
Engerlingen*

Plaats van aardappelen dit jaar.



Van de voorzitter

Bij het tuinieren liggen teleurstelling en vol plezier aan het werk gaan dicht bij elkaar.

Vol enthousiasme een aantal weken terug erwten en kapucijners in bakje gezaaid en als dan alles goed kiemt wil je in de tuin aan de slag. Niets is minder waar in zo'n weekend zoals nu. Het lijkt wel of we nog een stukje vergeten winter tegemoet gaan terwijl de lente al weer een paar dagen gelden is begonnen. Er zit niets anders op dan nog maar een poosje geduld te hebben en hopen dat de groei ook niet al te hard gaat. Gelukkig ben ik niet de enige en dat sterkt me weer een beetje. Er is nog steeds een spreekwoord als 'gedeelde smart is halve smart'.

Terugkijkend naar de algemene ledenvergadering is het goed weer te constateren dat deze goed werd bezocht. Dat sommige agendapunten meer tijd in beslag nemen dan vooraf ingepland is misschien ook de reden dat het toch nog een latertje werd en de bar intussen gesloten. Excuses voor dit feit, want dit was absoluut anders afgesproken. Toch was het geen vergadering waarop ik als voorzitter met plezier terug kijk. Daarvoor liepen de emoties toch te hoog op. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar hierdoor was het voor mij toch een vergadering met een "smetje". De behandeling van het beleidsplan heeft een aantal reactie opgeleverd, maar ik roep de leden toch nogmaals op ook hier een steentje bij te dragen. Ga er nog eens goed voor zitten en lever een positieve bijdrage ter verbetering van het huidige plan. Nog beter zelfs zou het zijn als enkele leden bereid zouden zijn om de inventarisatie van ieders "kwaliteiten" voor hun rekening te nemen. We kunnen wat dat betreft als bestuur best wat extra hulp gebruiken.

Tot besluit toch nog even een tip voor alle tuinliefhebbers: Kijk eens op om wat ideeën op te doen voor de open dag

<http://kleur-tuin.startpagina.nl/>

ENGERLINGEN

Engerlingen is een verzamelnaam van allerlei larven van bladsprietkevers. Een van meest voorkomende soorten in Nederland zijn:

Rozekever –
Phyllopertha horticola
kever vliegt vanaf



begin mei van 10.00 uur tot 15.00 s' middags laag over de grond. De volwassen kevers leggen hun eitjes in het gazon, maar ook onder allerlei sierplanten, zoals geraniums, heesters en jonge bomen. Gedurende hun vlucht beschadigen ze door vraat allerlei bloemen, blad en jong fruit. De engering doet er 1 jaar over om tot kever uit te groeien.

De volwassen kever is goed te vangen met een rozenkeverval waardoor de bloem- en bladvraat wordt gereduceerd en met deze val wordt bovendien de eerste vlucht van de kevers gesignaleerd. Na vaststelling van de eerste vlucht dan kan makkelijk worden uitgerekend wanneer de eerste engeringen er zijn.

Dan kan een aangetaste plek worden behandeld voordat schade ontstaat.

Schade door engeringen is te herkennen aan het vreten aan de wortels van allerlei grassen en planten.

Door engeringen aangetaste gazons komen los te liggen en kunnen als het ware worden opgetild als een tapijt. De secundaire schade ontstaat door vogels, egels, muizen, etc. die op zoek gaan naar de eiwitrijke larven.

Schade aan tuinplanten is te herkennen aan de slechte groei, verwelking en gewassterfte.

In feite dezelfde kenmerken als de gewassen die aangetast zijn door snuitkevers, waaronder de taxuskevers de meest